

Pneumodog

Vacina inativada com adjuvante contra Bordetella e Parainfluenza Tipo 2 dos cães.

USO VETERINÁRIO

Contém 10 frascos de 1 dose de vacina.

PNEUMODOG é uma vacina líquida e inativada, preparada a partir de corpos bacterianos **Bordetella bronchiseptica** e do vírus da Parainfluenza Tipo 2.

PNEUMODOG é isenta de antisséptico e contém substância adjuvante da imunidade.

PNEUMODOG é uma vacina altamente imunogênica e inócua a cães de qualquer faixa etária. A massa antigênica de cada fração é suficiente para oferecer uma sólida e rápida imunidade.

Indicação

PNEUMODOG é indicada na prevenção dos cães contra as afecções respiratórias por **Bordetella bronchiseptica** e Parainfluenza Tipo 2 (tosse de canil).

Vias de administração

Via subcutânea (SC) ou intramuscular (IM).

Esquema de vacinação sugerido

Primovacinação: duas doses com 2-3 semanas de intervalo (filhotes e adultos).

Filhotes nascidos de mães vacinadas: 1ª dose na 6ª semana de idade.

Filhotes nascidos de mães não vacinadas: 1ª dose na 4ª semana de idade.

Reforço: anual, recomendado aos reprodutores antes do período de reprodução e 7 dias antes de qualquer contato com outros cães.

Modo de usar e dosagem

A dose de 1,0 mL deve ser dada integralmente, qualquer que seja a idade, tamanho, peso, raça ou sexo do animal.

Agitar o frasco antes de usar.

Precauções de uso

- Vacinar somente cães em perfeito estado de saúde e corretamente desparasitados, no mínimo 10 dias antes da vacinação. Não administrar vermífugos nos próximos 10 dias.
- Respeitar as condições habituais de assepsia.
- Não usar seringas e agulhas esterilizadas com agentes químicos, pois podem afetar as características antigênicas da vacina.

- Não submeter os cães a esforços físicos ou estressantes durante o período da resposta imunoprotetora.
- Tomar as precauções habituais para manipulação de fêmeas em gestação.

Efeito secundário

Excepcionalmente, como qualquer produto biológico, a vacina poderá causar uma reação de hipersensibilidade. Neste caso, administrar Sulfato de Atropina.

Algumas vezes, a presença do Hidróxido de Alumínio poderá provocar o aparecimento de um pequeno nódulo transitório no local da injeção.

Observações

O sucesso da vacinação depende da utilização adequada do produto. Siga corretamente o modo de usar.

Prazo de validade e condições de conservação

24 meses após a data da fabricação.

Conservar ao abrigo da luz, em temperatura entre 2°C e 8°C. Não congelar.

Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do Médico Veterinário.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 4214 em 20/01/93.

Resp. técnica: Dr. Emílio C. Salani
CRMV-SP nº 3085.

Proprietário e fabricante:
Merial - Lyon - França

Representante exclusivo no Brasil, importador e distribuidor:

Merial Saúde Animal Ltda.

Fazenda São Francisco - Paulínia - SP
CNPJ 57.600.249/0001-55

Produto importado

Para informações adicionais,
consulte o Serviço de
Atendimento Gratuito ao Consumidor:

