

Conteúdo: 10 frascos de 1 dose (1 mL) de vacina liofilizada e 10 frascos de 1 dose (1 mL) de diluente estéril.

Vacina contra Rinotraqueíte, Calicivirose, Clamidiose e Panleucopenia felina

RCCP SWD



Feline-4

Uso Veterinário Produto Importado

Conservar entre 2°C e 7°C.
Não congelar.
Indicações, modo de usar e precauções: vide verso

Licenciado no Ministério da Agricultura sob n° 6.922 em 08/06/99.

RM2012R1

Proprietário e fabricante:
MERIAL INC.
Athens, Georgia 30601 USA
U.S. Vet. Lic. No. 298
Product No. 514410

Representante exclusivo no Brasil, importador e distribuidor:
MERIAL Saúde Animal Ltda.
Fazenda São Francisco-Paulínia-SP
CNPJ 57.600.249/0001-55-Ind. Brasileira
Resp. técnica: Dr. Emílio C. Salani
CRMV-SP nº 3085



DESCRIÇÃO: FELINE-4 contém uma suspensão liofilizada de vírus vivos atenuados da rinotraqueíte, calicivirose e panleucopenia felina e *Chlamydia psittaci*, propagados em uma linhagem celular estável, bem como água estéril como diluente. A eficácia da vacina foi avaliada através de testes de vacinação e desafio, enquanto que a inocuidade foi demonstrada em avaliações no campo.

INDICAÇÕES: FELINE-4 é recomendada para a vacinação de gatos contra as doenças causadas pelos vírus da rinotraqueíte, calicivírus e da panleucopenia felina e como auxiliar na atenuação da doença causada por *Chlamydia psittaci*.

DOSAGEM: reconstituir a vacina liofilizada com o diluente líquido que a acompanha e injetar asépticamente uma dose (1 mL) em gatos saudáveis por via subcutânea ou intramuscular. Na primovacinação, revacinar com uma segunda dose de 1 mL após 3 a 4 semanas. Gatos com menos de 12 semanas de idade devem ser revacinados a cada 3 a 4 semanas até atingir 12 a 16 semanas de idade. Revacinar anualmente com dose única de 1 mL.

PRECAUÇÕES: Conservar em temperatura entre 2°C e 7°C. Usar todo o conteúdo da vacina imediatamente após a reconstituição. Não utilizar produtos químicos para esterilizar seringas e agulhas. Queimar os frascos vazios e as sobras de produto não utilizadas. Contém gentamicina como conservante. Geralmente, recomenda-se não vacinar gatas prenhes. Em caso de reação anafilática, administrar epinefrina. Como em quaisquer outras vacinas, em casos excepcionais podem ocorrer reações de hipersensibilidade que requerem tratamento sintomático adequado.

APRESENTAÇÕES: estojos contendo 10 doses (10 frascos de vacina e 10 frascos de diluente).

Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do médico veterinário.

Utilizar somente o diluente específico fornecido pelo fabricante desta vacina, visto que todas as provas de controle da qualidade foram realizadas com o diluente próprio.

RM2012R1